

Mentions légales

FRONTLINE® Combo

Composition qualitative et quantitative

FRONTLINE Combo Spot-On Chat

Fipronil 50 mg. (S)-méthoprène 60.0 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.10 mg.

Butylhydroxytoluène (E321) 0.05 mg. Excipient QSP 1 pipette 0.5 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien S

Fipronil 67 mg. (S)-méthoprène 60.3 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.13 mg.

Butylhydroxytoluène (E321) 0.07 mg. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien M

Fipronil 134 mg. (S)-méthoprène 120.6 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.27 mg.

Butylhydroxytoluène (E321) 0.13 mg. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien L

Fipronil 268 mg. (S)-méthoprène 241.2 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.54 mg.

Butylhydroxytoluène (E321) 0.27 mg. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL

Fipronil 402 mg. (S)-méthoprène 361.8 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.80 mg.

Butylhydroxytoluène (E321) 0.40 mg. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml.

Forme pharmaceutique

Solution pour spot-on. Solution claire ambrée.

Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et les tiques et/ou les poux broyeur.

Chez les chiens

-Traitement de l'infestation par les puces (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des oeufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des oeufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application.

-Traitement de l'infestation par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines.

-Traitement de l'infestation par les poux broyeur (*Trichodectes canis*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP).

Chez les chats

Élimination des puces (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines.

Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des oeufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des oeufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après application.

Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*).

Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines.

Élimination des poux broyeurs (*Felicola subrostratus*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP).

Chez les furets :

-A utiliser contre les infestations par des puces seules ou des infestations mixtes par des puces et des tiques.

-Élimination des puces (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des oeufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des oeufs pondus par les puces adultes.

-Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste (selon les données expérimentales) pendant 4 semaines.

Contre-indications

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg ; ne pas traiter les furets de moins de 6 mois ; ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

Ne pas utiliser chez les animaux malades par exemple (maladies systémiques, fièvre) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien : ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez le chat car cela peut conduire à un surdosage.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux : L'administration de ce médicament nécessite des précautions à prendre par la personne qui l'administre. Lors de sa prescription et de sa délivrance, il est nécessaire d'inviter les propriétaires à prendre connaissance de la notice avant utilisation.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Ne pas surdoser.

Chats :

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. De la salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation.

En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée.

Chiens:

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés.

Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée.

Utilisation en cas de grossesse et ou de lactation et de ponte

Chiens et chats

La spécialité peut être utilisée pendant la gestation et la lactation.

Furets

Les études de laboratoire sur les chats n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes, foetotoxiques ou maternotoxiques. Chez le furet, l'innocuité de ce médicament vétérinaire n'a pas été testée durant la gestation et la lactation. L'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire.

Posologie

Chats : la dose minimale recommandée est de 5 mg de fipronil et 6 mg de (S)-méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée, soit une pipette de 0.5 ml pour un chat. En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Furets : Une pipette de 0.5 ml par furet, soit une dose de 50 mg de fipronil et 60 mg de (S)méthoprène par furet, en une application cutanée. L'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Chiens : la dose minimale recommandée est de 6.7 mg de fipronil et de 6 mg de (S)méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée.

Chien de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien S par animal (0.67 ml),

Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien M par animal (1.34 ml),

Chiens de 20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien L par animal (2.68 ml),

Chiens de plus de 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL par animal (4.02 ml).

En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Temps d'attente

Sans objet.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MERIAL -29 avenue Tony Garnier -F-69007 LYON.

Présentations

FRONTLINE Combo Spot-On Chat
FR/V/3168431 0/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml.
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml.
FRONTLINE Combo Spot-On Chien S
FR/V/7543476 4/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml.
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml.
FRONTLINE Combo Spot-On Chien M
FR/V/7565368 8/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1.34 ml.
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml.
FRONTLINE Combo Spot-On Chien L:
FR/V/2879019 8/2003

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml.
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml.
FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL
FR/V/8787746 7/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml.
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml.

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

Date A.M.M. 23/01/03.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

FRONTLINE Combo Spot-On Chat FR/V/3168431 0/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml.
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml.
FRONTLINE Combo Spot-On Chien S
FR/V/7543476 4/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml.
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml.
FRONTLINE Combo Spot-On Chien M
FR/V/7565368 8/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1.34 ml.
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml.
FRONTLINE Combo Spot-On Chien L:
FR/V/2879019 8/2003

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml.
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL
FR/V/8787746 7/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml.

Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire.

FRONTLINE Combo® Spot-On Composition qualitative et quantitative FRONTLINE Combo Spot-On Chat Fipronil 50 mg. (S)-méthoprène 60.0 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.10 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.05 mg. Excipient QSP 1 pipette 0.5 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien S Fipronil 67 mg. (S)-méthoprène 60.3 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.13 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.07 mg. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien M Fipronil 134 mg. (S)-méthoprène 120.6 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.27 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.13 mg. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien L Fipronil 268 mg. (S)-méthoprène 241.2 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.54 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.27 mg. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL Fipronil 402 mg. (S)-méthoprène 361.8 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.80 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.40 mg. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml. **Forme pharmaceutique** Solution pour spot-on. Solution claire ambrée. **Indications d'utilisation** A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et tiques et/ou les poux broyeurs. Chez les chiens Elimination des puces (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des oeufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des oeufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application. Elimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines. Elimination des poux broyeurs (*Trichodectes canis*). Chez les chats Elimination des puces (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des oeufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des oeufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après application. Elimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines. Elimination des poux broyeurs (*Felicola subrostratus*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP). **Posologie** Chats : la dose minimale recommandée est de 5 mg de fipronil et 6 mg de (S)-méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée, soit une pipette de 0.5 ml pour un chat. Chiens : la dose minimale recommandée est de 6.7 mg de fipronil et 6 mg de (S)-méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée. Chien de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien S par animal (0.67 ml), Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien M par animal (1.34 ml), Chiens de 20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien L par animal (2.68 ml), Chiens de plus de 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL par animal (4.02 ml). En l'absence de données de tolérance, le minimum d'intervalle de traitement est de 4 semaines. **Contre-indications** En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg ; ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades par exemple (maladies systémiques, fièvre) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. FRONTLINE Combo Spot-On Chien : ce produit a été spécialement développé pour

les chiens. Ne pas utiliser chez le chat car cela peut conduire à un surdosage. **Effets indésirables** Chez les chats.

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée. Ne pas surdoser. Chez les chiens Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée. Ne pas surdoser. **Temps d'attente** Sans objet. **Titulaire de l'autorisation** de mise sur le marché Merial -29 avenue Tony Garnier -F-69007

LYON. **Présentations** FRONTLINE Combo Spot-On Chat: FR/V/3168431 0/2003 Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien S: FR/V/7543476 4/2003 Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien M: FR/V/7565368 8/2003 Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien L: FR/V/2879019 8/2003 Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL: FR/V/8787746 7/2003 Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Date A.M.M. 23/01/03. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. **Classement du médicament en matière de délivrance** Usage vétérinaire.